

Вертицилін

Біопрепарат на основі гриба *Verticillium lecanii*. Застосовується проти оранжерейної білокрилки та різних видів попелиці на овочевих і декоративних культурах, відкритого і закритого ґрунту.

Багато клопоту додають городникам різні маленькі комахи та метелики. Приміром - білокрилка. Молоді личинки цієї розбійниці дуже рухливі, збираються на нижньому боці листа, а як харчування вибирають собі соки різних рослин. Якщо ви раптом помітили, що з ваших рослин злітають маленькі метелики, схожі на міль - насторожіться. Це білокрилка зайнялася вашим урожаєм. Переверніть листок і ви побачите невеликі лусочки - це її личинки. Потім на пагонах і листках утворюються жовті хлоротичні плямочки, які з часом перетворюються на липкий наліт або в медвяну росу. Це вже відходи життєдіяльності білокрилки. Ріст рослин пригнічується і сповільнюється. Природно, що про гарний урожай уже не може бути й мови.

А є ще її подружка - попелиця. Вона теж не проти поласувати клітинними соками рослин. Але, крім того, попелиця виділяє отруту, який дуже згубно впливає на листя, змушуючи його скручуватися. У результаті воно деформується і відмирає. Рослина при цьому різко уповільнює свій ріст і розвиток, верхівки викривляються. Мало того, через солодке отруйне виділення, рослина може заражатися різними вірусами і тоді збиток просто непоправний. Коли попелиці стає дуже багато листя і молоді пагони всихають і гинуть. Попелиця розмножується дуже швидко і, причому, робить це постійно. Любить попелиця молоді, ніжні рослини. Їхні листочки вона протикає своїм хоботком і починає висмоктувати сік. Селиться попелиця на верхівках рослин і на нижніх сторонах листочків.

На допомогу нам приходять дивовижний біопрепарат "Вертицилін"

Потрапляючи на тіло шкідника, він проростає в його порожнину, виділяє токсини і спричиняє його загибель.

Норма витрати:

- Витрата препарату від 100 до 500 мл на 10 л. води залежно від ступеня зараженості рослин. Обприскування рекомендується проводити за температури навколишнього середовища 12-28 градусів і відносної вологості повітря: 80-85%.
- Розчин використовувати протягом доби.
- Обробляти 2-3 рази в період вегітації рослин з інтервалом 10-12 днів, а за великої чисельності шкідників - кожні 5-7 днів.

Сумісний з іншими біопрепаратами в баковій суміші.

Переваги:

- Безпечний для людей і тварин.
- Не чинить негативного впливу на бджіл.

Термін зберігання: 2 місяці за температури+ 4 ...+6 С.

(044) 338-28-03

Купити біопрепарати

(067) 269-88-40

(095) 285-07-13

biopreparaty.biz.ua

(093) 156-64-74